{Variety} P. 24 in: Cecconi, G. Contributo alla Fauna delle Isole Tremiti. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino 583: 1-53.

RECORDED IN ANTBIB

	Italia continent.	ISOLE TREMITI			Pianosa	Dalmazia
		S. Domino	Caprara	S. Nicola		
Tetramorium caespitum var. *diomedea* Emery, nova varietas. È forma schiava dello *Strongylognathus huberi* For. La ♀ presenta nella forma dei due segmenti del peziolo, molto corti e larghi, e il primo subsquamiforme ed inciso ad arco nel mezzo, una struttura caratteristica che è simile a quella della sottospecie *ferox* Ruzsky, della Russia meridionale e dell'Ungheria; però la forma delle Tremiti è più piccola e differente per scoltura e per colore			+	+		
Strongylognathus huberi For., subsp. *rehbinderi* For., var. *cecconii* Emery, nova varietas. ♀. Colore come la s. sp. *rehbinderi* For., ma col capo ancora più scuro. Capo non del tutto così largo come nella forma della Russia; scultura più debole, la superficie splendente del capo più estesa; strie arcuate non sempre ben distinte. Dorso del pro-mesonoto in massima parte lucido. Lunghezza 3-3,2 mm.			+	+		
Pheidole pallidula Nyl. . .	+	+	+			+
Lasius alienus Favr.	+	+				+
Camponotus maculatus pallens Nyl.	Calabria	+				
Camponotus maculatus aethiops Latr.		+	+	+		
Camponotus lateralis Ol. . .		+	+	+	+	+
Plagiolepis pygmaea Lk. . .	+	+	+	+	+	+
Acantholepis frauenfeldi Mayr. var. *niger* Emery. È forma orientale e manca nelle Isole tirrene e in Sardegna . .	i. merid.	+	+			+
Fam. **Apidae.**						
Andrena nana Kb. (det. Magretti).	+	+				

Emery, C. 1908.

[20 May 1908]

	Italia continent.	ISOLE TREMITI			Pianosa	Dalmazia
		S. Domino	Caprara	S. Nicola		
Halictus scabiosae Rossi. . .	+	+			+	+
Halictus clavipes Dourr. (det. Schmiedeknecht).		+				
Halictus smeatmanellus Kb. (det. Magretti).	+		+			+
Halictus villosulus Kb. (det. Magretti).	+	+		+		
Xylocopa violacea L. . . .	+	+				+
Eucera grisea Fabr. (det. Magretti).	+	+			+	+
Podalirius garrulus Rossi (det. Magretti).		+				
Bombus terrestris L. ♂ e ♀ .	+	+				+
Ordine: *Lepidoptera.*						
Macrolepidoptera.						
Fam. Pieridae.						
Pieris brassicae L.	+	+	+	+		+
Pieris rapae L.	+	+	+	+		+
Pieris daplidicae L.	+	+	+	+		+
Colias edusa F.	+			+		+
Fam. Nymphalidae.						
Pyrameis cardui L. Comunissima ; qualche esemplare anche in febbraio.	+	+	+	+		+
Vanessa polychloros L. un esemplare sulla fine di febbraio.	+			+		+
Orneosoma sinuella Fabr. . .	+	+				+
Pararge megera L. È la specie più comune durante la buona stagione; un esemplare anche in febbraio.	+	+	+	+		+
Epinephele ida Esp. ♂ ♀ ♀. .	+	+				+
Fam. Lycaenidae.						
Chrysophanus phloeas L. . .	+	+	+	+		+
Lycaena astrarche Berg. . .	+			+		+
Lycaena icarus Rott. . . .	+			+		+
Fam. Sphingidae.						
Acherontia atropos L. Un esemplare.	+	+				+
Macroglossa stellatarum L. Trovai alcuni esemplari in febbraio nei luoghi abitati; in maggio frequente sui fiori di *Onopordon.*	+	+		+		+